

CÓMO RECONOCER A UN NIÑO ENFERMO DEL CORAZÓN

SÍNTOMAS:



PALPITACIONES



DOLOR PRECORDIAL



DESMAYOS

DISNEA



EPISTAXIS



DIAFORESIS



NEUMONÍA A REPETICIÓN

SIGNOS:



FENOTIPO SINDROMAL



DIFICULTAD RESPIRATORIA



CIANOSIS

SOPLO



PULSOS DÉBILES O AUSENTES EN EXTREMIDADES INFERIORES



DEDOS EN PALILLO DE TAMBOR




UÑAS EN VIDRIO DE RELOJ

HEMITORAX IZQUIERDO PROMINENTE



HEPATOMEGALIA



ARRITMIA/TAQUICARDIA



BAJO PESO

Si el paciente presenta uno o más de los signos o síntomas descritos
PUEDE SER ENFERMO DEL CORAZÓN.
¡DERIVELO/A AL CARDIÓLOGO PEDIATRA!

Dräger

develoPPP.de

cooperación alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementada por:

giz
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Palpitaciones: Sensación del latido cardiaco, referida por el paciente.

Dolor precordial: Dolor en el pecho durante un esfuerzo físico.

Desmayo: Pérdida de la conciencia.

Disnea: Sensación de falta de aire.

Epistaxis: Sangrado nasal.

Diaforesis: Sudoración profusa a consecuencia del esfuerzo.

Neumonía a repetición: Infección en los pulmones.

Fenotipo sindromal: Aspecto físico que sugiere un síndrome.

Dificultad respiratoria: Evidencia de esfuerzo al respirar.

Cianosis: Color morado de la piel y las mucosas.

Soplo: Ruido anormal durante la auscultación cardiaca.

Uñas en vidrio de reloj: Uñas abombadas.

Dedos en palillo de tambor: Dedos deformados por la falta crónica de oxígeno.

Pulsos débiles o ausentes en extremidades inferiores: En comparación con los pulsos radiales, los pulsos pedios son difíciles de sentir o no se logran palpar.

Hemitorax izquierdo prominente: Deformación del tórax en el lado izquierdo por dilatación del corazón.

Hepatomegalia: Aumento del tamaño en el hígado.

Arritmia: Latido irregular del corazón.

Bajo peso: Peso por debajo del percentil diez para la edad.



